
Diş Hekimliğinde Eldiven

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ZORTUK

*Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,
Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, KAYSERİ*

Günümüzde kullanılan eldivenler ilk olarak Dr. Thomas Watson tarafından cerrahi sırasında hekimlerin ellerini muhafaza etmek için 1843 yılında önerildi. 1885 yılına kadar pamuktan yapılmış ilk cerrahi eldivenler kullanıldı. Lastik eldivenler John Hopkins Üniversitesi cerrahi bölümünde çalışan profesör William Halstead tarafından 1890 yılında operasyonlarda kullanıldı. Amaç sadece tek kullanımlık eldiven kullanımı, aseptik tekniği geliştirmek, infeksiyon riskini düşürmek değil aynı zamanda dezenfektan ajanların ve yakıcı antiseptiklerin dokuya zarar verici etkilerinden hastayı korumaktı. Bazı çevreler, elleri sıktığından ve detaylı işlemlere karşı hassasiyeti azalttığından, çıplak elden eldivenli diş hekimliğine geçiş uzun bir zaman almıştır.

Amerikan Diş Hekimleri Birliği (ADA) 1976 yılında en sık infeksiyon oluşturan kan kaynaklı mesleki patojen olarak bilinen hepatit B virüsünden korunmak için “Dental Therapeutic” konseyinde tek kullanımlık eldiven kullanımına değindi ve “pratikte eldiven kullanımına kanamalı işlemler için dental okul eğitimi aracılığı ile teşvik edilmelidir.” bildirisi yayınlandı.

Diş hekimi, hasta, yardımcı personel ve laboratuvar teknisyenleri önemli derecede çapraz kontaminasyon riski altındadır ve dolayısıyla en önemli bariyer olan eldivenlerin çok iyi seçilmesi gerekmektedir. Eldivenler kimyasal yapısı, kalınlığı, fiziksel özellikleri üretici firma tarafından belirtilme ve hekim bunlara göre eldiven seçmelidir.