

G. SAKARYA, E. UYGUNER

Medilife Beylikdüzü Cerrahi Tıp Merkezi, İSTANBUL

Giriş: 06.06.08 tarihinde acil servisimize başvuran 23 yaşındaki erkek hastanın; üzerine kaynar su dökülmesi sebebiyle sağ kolunda 2. derece yanık mevcuttu. Hasta 3 gün önce farklı bir kurumda ilk müdahalesini yaptırmıştı.

Bu hastaya 10 gün boyunca; ilk 4 gün peşpeşe, diğer günler gūnaşırı olmak üzere toplam 7 kez pansuman yapılmıştır. Vakanın ilk hali ve 10 gün sonraki hali hastanın izni ile fotoğraflanmıştır.

Amaç: Yanıkta actolind kullanımının değerlendirilmesi.

Uygulama: Pansumanlarını yaparken şu sırayı takip ettik. Yara uygun şekilde açıldı. İzotonik ile; ön yıkaması yapıldı. Actolind sıvı ile; tekrar yara yıkandı. Yıkama sonrası ölü dokuların sağlam ciltten ayrıldığı gözlemlendi. Ölü dokular debrite edildi. Tüm yarayı kaplayacak şekilde Actolind jel sürüldü. Yara uygun şekilde kapatıldı.

Sonuç: 10 gün içinde tam iyileşme sağlandı.



Resim 1.