

G. SAKARYA

Medilife Beylikdüzü Cerrahi Tıp Merkezi, İSTANBUL

Giriş: Vaka; 1992 yılında (17 yıl önce) opere olduğu bölgede venöz yetmezliğe bağlı ülser oluşan ve Tip2 Diabetes Mellitus bulunan 62 yaşında kadın hastadır. Hastanın beden kitle endeksi %42.4'tür. Bu hastaya 12 hafta boyunca; gūnaşırı olmak üçlü bandaj sistemi eşliğinde, toplam 42 kez pansuman yapılmıştır. Vakanın ilk hali ve 82 gün sonraki hali hastanın izni ile fotoğraflanmıştır.

Amaç: Venöz ülslerde actolind kullanımının değerlendirilmesi.

Uygulama: Üçlü bandaj sistemi ile beraber Actolind jel ve sıvı kullanılarak pansumanları uygulandı. Yara uygun şekilde açıldı. İzotonik ile; ön yıkaması yapıldı. Actolind sıvı ile; tekrar yara yıkandı. Yıkama sonrası ölü dokuların, sağlam ciltten ayrıldığı gözlemlendi. Ölü dokular debrite edildi. Tüm yarayı kaplayacak şekilde Actolind jel sürüldü. Yara uygun şekilde kapatıldı. Üzerine üçlü bandaj sistemi uygun şekilde sarılarak uygulandı.

Sonuç: Seksen iki gün içinde tam iyileşme sağlandı.



Resim 1.